

**Anlage 2:**

**Wiederzulassung zum Besuch der Schule bzw. Gemeinschaftseinrichtung**

<b>Wiederzulassung* nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 2001</b>			
<b>Attest erforderlich</b>	<b>Attest nicht erforderlich Wiederzulassung erfolgt nach</b>		
	<b>Intervall nach Krankheitsbeginn</b>	<b>Intervall nach Beginn einer nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführten Antibiotikabehandlung</b>	<b>Intervall nach Abklingen bestimmter Symptome</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wiederholter Kopflausbefall</li> <li>➤ Skabies (Krätze)</li> <li>➤ Impetigo</li> <li>➤ (Ansteckende Borkenflechte)</li> </ul>	<b>Hepatitis A</b> 7 Tage nach Auftreten des Ikterus oder 14 Tage nach Auftreten der ersten Symptome	<b>Keuchhusten</b> 5 Tage	<b>Akute Gastroenteritis</b> Abklingen des dünnflüssigen Durchfalls
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tuberkulose</li> <li>➤ Diphtherie</li> </ul>	<b>Masern</b> 5 Tage nach Auftreten des Ausschlags	<b>Scharlach, Streptokokkenangina</b> 24 Stunden	<b>Meningitis</b> Nach Abklingen der Symptome
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ EHEC ** – Enteritis</li> <li>➤ Shigellose (Ruhr)</li> <li>➤ Cholera</li> <li>➤ Typhus</li> <li>➤ Paratyphus</li> </ul>	<b>Mumps</b> 9 Tage nach Anschwellen der Ohrspeicheldrüse	<b>Erstmaliger Kopflausbefall</b> Nach medizinischer Kopfwäsche	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Polio</li> <li>➤ Pest</li> <li>➤ VHF (virusbedingtes hämorrhagisches Fieber)</li> </ul>	<b>Windpocken</b> 7 Tage nach Auftreten der ersten Bläschen	*) unter dem Gesichtspunkt, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr zu befürchten ist **) Entero-Haemorrhagische Escherichia-Coli-Bakterien	